


PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO

Test de VPH como tamizaje primario Provincia de Entre Rios

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Lic. Agustín Oliveto

Situación epidemiológica del cáncer cervicouterino en Argentina




Mayores tasas de mortalidad

- Mujeres sin cobertura de salud y/o acceso limitado a los servicios de salud.
- Mujeres con menor nivel económico [pobres, desempleadas, inactivas].
- Mujeres con menor nivel educativo.

Fuente: Globocan, 2018, DEIS, 2020.

Fuente: PNPCC, 2015; Arrossi et al., 2008; Arrossi, 2007.

Tasas de mortalidad por CCU estandarizadas por edad, según jurisdicciones de Argentina. Trienio 2016-2018




Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por la DEIS.

El cáncer cervicouterino refleja con máxima crudeza la desigualdad social y de género en salud.



Estrategia integral para la prevención del CCU en Argentina

Prevención primaria



Vacuna contra el VPH


Prevención secundaria



Test de VPH

Citología

Tamizaje para la prevención del CCU en Argentina




- Tamizaje con Test VPH:**
 - A partir de 30 años
 - Focalización en 30-64 años
 - Frecuencia: cada 5 años
- Tamizaje con PAP:**
 - A partir de 25 años
 - Focalización en 35-64 años
 - Frecuencia: cada 1-1-3 años
- Estrategia mixta de tamizaje**



Fuente: Elaborado por el PNPCC-INC

Ventajas del tamizaje basado en el test de VPH

- Test de alta sensibilidad (95%). Alto valor predictivo negativo que posibilita espaciar el intervalo del tamizaje.
- Lectura automatizada.
- Test recomendado en contexto de vacunación contra VPH.
- Mayor efectividad para la detección de lesiones precursoras del cáncer.
- Permite la autotoma por parte de las mujeres.



La OMS y la OPS instan a los países miembros a incorporar el Test de VPH a sus programas de tamizaje.





Incorporación del Test de VPH en Argentina

2010


2011

2012-2014

2014 en adelante




Incorporación del Test de VPH como método de tamizaje en Argentina



Estrategia de tamizaje con Test de VPH

- Población objetivo: Mujeres 30+ años, sin cobertura de salud.
- Repetición a los 5 años en caso de test-.
- Seguimiento a los 18 meses en caso de test+ PAP-.
- Colposcopia y eventual biopsia para test+ PAP ASCUS+.



Principales puntos para una estrategia de tamizaje efectiva

- Búsqueda activa de mujeres para el tamizaje, focalización 30-64.
- Capacitación permanente de los equipos de APS.
- Fortalecimiento de la red de diagnóstico y tratamiento (calidad diagnóstica de los nodos colpo/biopsia).
- Estrategia navegadoras, para asegurar el seguimiento y tratamiento de las mujeres con tamizaje positivo.
- Registro en SITAM para el monitoreo de la estrategia.
- Desarrollo de estrategia de comunicación integral.
- Toma doble (dirigida) para evitar pérdida de mujeres en el triage.
- Autotoma para el aumento de la cobertura
- Centralización del laboratorio de VPH, citología y anatomía patológica.

Consideraciones para el Tamizaje en contexto de Pandemia COVID-19

A pesar de la pandemia, garantizar la continuidad de la prevención del CCU es fundamental. Se recomienda que se evalúe la situación epidemiológica en cada jurisdicción y se realice el tamizaje según las posibilidades del sistema local de cumplir con los protocolos de atención segura.

Entre Ríos

Cálculos de meta de cobertura, número esperado de Test+ y de mujeres a seguir

Total de pobl. Obj. a tamizar en 5 años (meta 80%)	Meta anual esperada	Test de VPH Positivos esperados (13%)	Mujeres a derivar a colposcopia (30%)
70268	14054	1827	548

Entre Rios

Test entregados y consumo

Primera Entrega de Test (vencimiento septiembre 2021)	Segunda Entrega de Test (vencimiento febrero 2022)	Tests consumidos septiembre 2020 – diciembre 2020)	Tests consumidos enero 2021 – febrero 2021)	Test consumidos marzo 2021 (estimado)	Test consumidos	Promedio de consumo mensual de la provincia	Stock de Test con vencimiento en septiembre de 2021 (a marzo de 2021)
8.184	5.406	0	196	159	755	300	7429

Entre Ríos

Ultimas acciones realizadas

2019

- Se visitó el laboratorio de VPH del Htal. San Martin para realizar un relevamiento de las condiciones edilicias, la infraestructura, y el equipamiento con miras a la incorporación del tamizaje con Test de VPH.
- Participación del PNPCC/INC en curso del IPC de Entre Ríos
- Las navegadoras participaron en el encuentro nacional de navegadoras organizado por el PNPCC en Junio y reciben capacitación y asistencia permanente.
- Se viajó a la provincia para la realización de una mesa de gestión con autoridades provinciales para evaluar y establecer acuerdos en el marco de la preparación para la incorporación del Test de VPH como tamizaje primario.

2020

- Se monto el Laboratorio de VPH en el Servicio de Citología del Htal. San Martin
- Se entregaron 8184 test de VPH
- Se realizaron mesas de gestión con los referentes locales para definir y planificar la prueba piloto de incorporación del tamizaje basado en test de VPH en contexto de pandemia
- Se realizaron capacitaciones virtuales al personal encargado del Lab. de VPH
- Se realizó una jornada virtual para tomadores de muestra en el marco de la prueba piloto
- Se realizó una jornada virtual para AS de muestra en el marco de la prueba piloto

2021

- Se realizó la capacitación presencial al personal encargado del Lab. de VPH
- Se entregaron 5406 test de VPH

La incorporación del Test de VPH

Actúa como

- **Agente movilizador: genera expectativa de cambio y compromiso de los y las profesionales de la salud.**

Necesita

- **Consenso, acuerdo y apoyo de los actores involucrados/as en la prevención del cáncer cervicouterino.**

Implica cambios

- **De las prácticas**
- **de las maneras de trabajar**
- **Del praradigma vigente**
- **De la organización de los recursos humanos y los servicios**



Instituto Nacional
del Cáncer



Ministerio de Salud
Argentina

Argentina unida

Entre Ríos

Meta de cobertura VPH

Población objetivo: mujeres 30 a 64 años c/ cobertura pública de salud

Total de Mujeres	Total Mujeres de 30 a 64 años	Pobl. con cobertura pública de salud	Meta de cobertura al 100% (Total Mujeres 30 a 64 años s/ cobertura de salud)
631.438	245.872	0,36	87.835

Meta de cobertura acordada por 5 años al 80% (PO c/cob. Pública de salud)	Alcance de meta anual	N° de Test de VPH Positivos esperados (13%)	N° de mujeres con VPH Positivo + Pap anormal que necesitarían colposcopia (30%)
70.268	14.054	1.827	548