Flujograma para la implementación de terapia con CNAF

IRAB en paciente de 1-24 meses

Puntaje Score de Tal de 6 o 7* al ingreso. Más: Fracaso de oxigenoterapia de bajo flujo (hasta 3 l/min, 3 horas) * Según lo dispuesto en la jurisdicción.

Puntaje de Tal de 8

Implementación de terapia CNAF
FiO_2: 0,6 - Flujo: 2 l/kg/minuto

Monitoreo
Ajuste de FiO_2
2 horas

Criterios de éxito

- Paciente confortable
- $FiO_2 \leq 60\%$ para mantener la $SatO_2 \geq 94$ %.
- Disminución de un 15-20% la FC y FR, o dentro del rango normal para edad.
- Mejora en el tiraje o el uso de músculos accesorios y desaparición del quejido espiratorio.

Criterios de fracaso

- Persiste o aumenta la dificultad respiratoria en las primeras 2 horas.
- Persiste o aumenta la FR y FC por arriba del rango normal para edad.
- Con $FiO_2 \geq 60\%$ y flujo de 2 l/kg/minuto, presenta saturación <94%.
- Signos de deterioro neurológico.
- Signos de descompensación hemodinámica.
- Signos de agotamiento.

Éxito

Fracaso
Transferir a UCIP.

Estabilidad como mínimo 2 horas

Con $Sat.O_2$ 94%: iniciar descenso de FiO_2 cada 4 horas hasta FiO_2=0,3.
($Sat.O_2$ objetivo: 94-97%)

Empeora → **Volver a parámetros previos**

Estable 4 horas

Disminuir flujo gradualmente hasta 1 l/kg/minuto

Empeora → **Volver a parámetros previos**

Estable 4 horas

Retirar terapia CNAF y pasar a cánula nasal convencional.