



**Hoy tuve mi primera relación sexual, no me cuidé porque en la primera vez no pasa nada.**




El riesgo de transmitir y contraer VIH existe desde la primera relación sexual.


El uso correcto de preservativo previene la transmisión.




**Estoy cursando un embarazo, vivo con VIH, mi bebé nacerá con VIH.**




Una detección temprana y la buena adherencia al tratamiento disminuyen las probabilidades de que el bebé nazca con el virus.




**Soy mamá, vivo con VIH y  
quiero amamantar a mi bebé  
porque así lo protejo.**




En esta situación, la lactancia materna está contraindicada.




**Ya soy un hombre mayor, no voy a usar preservativo porque a esta edad no me va a pasar nada.**




En una práctica sexual sin protección la posibilidad de contraer VIH siempre existe.




**Me diagnosticaron VIH,  
voy a morir de sida.**




El sida es el estadio avanzado de la infección por el VIH.



**Vivo con VIH, estoy en tratamiento, comencé a sentirme mejor, voy a descansar de la medicación un tiempo.**




La adherencia al tratamiento es lo que permite sostener la calidad de vida y evitar el progreso de la enfermedad.




**I=I**


**Indetectable = Intransmisible.**




Una persona con carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual.




**En mi trabajo me pidieron  
hacerme el test de VIH y de  
sífilis, tengo derecho a negarme.**




No pueden obligarme ni para la  
postulación, ni para el ingreso  
ni para un ascenso.




**Vivo con VIH, tengo que  
contárselo a mi familia.**



Es decisión de cada persona  
compartir su diagnóstico con  
quien considere.



**Tuve sífilis una vez, ya no  
puedo volver a tenerla.**



El riesgo de volver a contraer  
sífilis siempre está.