



## DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19. Actualización 16 de septiembre de 2020. 16 hs.

*La definición es dinámica y puede cambiar según la situación epidemiológica.*

**Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del paciente y comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos estrechos, sin esperar los resultados de laboratorio.**

**Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica periódica para identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos diferenciales**

### DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO

#### Criterio 1

a) Personas que **NO RESIDEN** en zonas de circulación comunitaria o por conglomerado\*:

Toda persona de **cualquier edad** que tenga **antecedente de viaje a zona de circulación comunitaria o por conglomerado en los últimos 14 días** y que presente **DOS O MÁS** de los siguientes síntomas:

- Fiebre (37.5°C o más)
- Tos
- Odinofagia
- Dificultad respiratoria
- Cefalea
- Mialgias
- Diarrea / vómitos\*\*

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica

*\*\*Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.*



**b) Personas que RESIDEN en zonas de circulación comunitaria o por conglomerado\*:**

Toda persona de **cualquier edad** que presente **DOS O MÁS** de los síntomas enunciados anteriormente.

**c) Toda Persona que independientemente del lugar de residencia y/o antecedente de viaje a zonas de circulación comunitaria o por conglomerado presente **enfermedad respiratoria aguda moderada/severa.****

**d) Toda persona que presente pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada**

*\* Ver Documento COES actualizado de Clasificación de localidades según la situación epidemiológica.*

**CRITERIO 2**

Toda persona que:

- Sea **trabajador de salud**
- **Resida o trabaje en instituciones cerradas** o de internación prolongada\*
- Sea **Personal esencial\*\***
- **Resida en barrios populares o pueblos originarios\*\*\***
- Sea **contacto estrecho** de caso confirmado de COVID-19, que dentro de los 14 días posteriores al contacto:

Presente **1 o más** de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o del olfato.

**Referencias:**

\* Penitenciarías, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños

\*\* se considera personal esencial:

Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas

Personas que brinden asistencia a personas mayores

\*\*\* Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares



### **CRITERIO 3**

#### **SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO\* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA:**

\*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días:

Y **dos** de los siguientes hallazgos:

- a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies).
- b) Hipotensión o shock.
- c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP).
- d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D).
- e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal).

**Y**

Marcadores elevados de inflamación: eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina.

**Y**

Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos)



## **DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO DE COVID-19**

### **1) CASO CONFIRMADO POR LABORATORIO**

Todo caso sospechoso con **resultado detectable** para la detección de genoma viral de SARS CoV-2 por técnicas directas.

### **2) CASO CONFIRMADO POR CRITERIO CLINICO-EPIDEMIOLÓGICO**

**Solo para zonas definidas con transmisión comunitaria sostenido o por conglomerado.**

**IMPORTANTE:** Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos **deben ser evaluados clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, durante toda su evolución.**

#### **CRITERIO 1:**

Toda persona que en los **últimos 14 días haya sido contacto estrecho con un caso confirmado por laboratorio** **Ó forme parte de un conglomerado de casos (pymes, empresas, instituciones)** con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin otro diagnóstico definido

#### **Y**

que presente **dos o más** de los siguientes síntomas:

- fiebre
- tos
- odinofagia
- dificultad para respirar
- vómitos/diarrea/cefalea/mialgias\*

*\*Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.*

#### **CRITERIO 2:**

Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con:

**Pérdida repentina del gusto o del olfato**



**CRITERIO 3:**

Toda persona con **signos y/o síntomas patognomónicos respiratorios de COVID-19** definido como:

Todo paciente internado en estado **moderado o grave** con signos y/o síntomas respiratorios patognomónicos de COVID-19 **MÁS tomografía** compatible con COVID-19, independientemente de que el resultado de laboratorio por PCR sea negativo.

En caso de imposibilidad de realizar TAC se evaluará la posibilidad de confirmarlo o quedará rotulado como caso confirmado.

**CRITERIO 4:**

Toda **persona fallecida** que:

- No tenga diagnóstico etiológico definido.
- Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o referido por terceros)
- Independientemente del estado de salud previo

Y

Que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado vinculada epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a áreas de transmisión comunitaria sostenida.

EN TODOS LOS CASOS COMPRENDIDOS EN ESTE CRITERIO SE PROCURARÁ EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO POR LABORATORIO

**CRITERIO 5: Todo personal de salud y personal esencial CONTACTO ESTRECHO CONVIVIENTE** de un caso de COVID-19 confirmado **por laboratorio**

Y

Que cumpla con la definición de caso sospechoso vigente (Criterio 2)

**NOTA 1:** Se procurará el diagnóstico etiológico por laboratorio a los casos confirmados por criterio clínico epidemiológico que formen parte de los siguientes grupos:

- Pacientes que presenten criterios clínicos de internación\*
- Personas con factores de riesgo\*
- Personas gestantes\*



- Trabajadores y trabajadoras de salud
- Personas fallecidas, sin etiología definida (punto 3)

\*A estos grupos se debe brindar atención clínica rápida y adecuada.

**NOTA 2** los contactos estrechos de casos confirmados, que **NO** presenten síntomas, **no son considerados casos de COVID-19, pero deben realizar cuarentena por 14 días.**

**Importante:** Las medidas de control a implementar tanto ante todo caso confirmado por laboratorio o por criterio clínico-epidemiológico son:

- Aislamiento y control clínico del caso.
- Identificación y aislamiento de contactos estrechos <sup>(1)</sup>.

**(1) Aislamiento de contactos estrechos:** Las personas convivientes identificadas como contactos estrechos se tratarán como una cohorte. En este sentido, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de los 14 días de aislamiento.

## **CRITERIO DE ALTA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19**

El alta epidemiológica se otorgará a los **10 días desde la fecha del hisopado para el análisis por PCR o del diagnóstico por criterio clínico epidemiológico realizada por el médico tratante,** siempre que el paciente presente una **evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático**



## **DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO**

**Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19.**

### **DEFINICION DE CONTACTO ESTRECHO**

- Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.
- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

#### **Adicionalmente debe considerarse:**

#### **- Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a:**

- Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19.
- Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).

#### **Contacto estrecho en personal de salud:**

Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes **sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado:**

- Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera).
- Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.).
- Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza de estos).
- Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles.



**No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento.**

Más información en “Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-19”. Ministerio de Salud de Nación:

[http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID-19-Evaluacion\\_riesgos\\_manejo\\_trabajadores\\_salud\\_expuesto.pdf](http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID-19-Evaluacion_riesgos_manejo_trabajadores_salud_expuesto.pdf)

**Contacto estrecho en un avión/bus:**

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.

**Contacto estrecho en un buque:**

Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados.