

ACTUALIZACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (al 05/10/2020)

El siguiente documento COES, hace referencia a la Clasificación de Zonas según Situación Epidemiológica, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación

<https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/clasificacion>

Esta clasificación es dinámica y será actualizada semanalmente, a partir de la información recabada en el SNVS 2.0 - SISA, con respecto a la presencia en cada localidad de casos confirmados activos y sus características epidemiológicas, en los últimos 14 días.*

4.- Zonas con transmisión comunitaria sostenida

- PARANÁ
- GUALEGUAYCHÚ

3.- Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria:

- CRESPO
- GUALEGUAY
- CHAJARI
- CONCORDIA
- GENERAL RAMIREZ
- CONCEPCION DEL URUGUAY
- DIAMANTE

2.- Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados:

- VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN
- ROSARIO DEL TALA
- VILLAGUAY
- SAN BENITO
- VIALE
- ALDEA MARIA LUISA

- BASAVILBASO
- VICTORIA
- LARROQUE
- SANTA ELENA
- COLONIA ENSAYO
- COLONIA AVELLANEDA
- ORO VERDE
- MARIA GRANDE
- SEGUI
- HERNANDEZ
- LA PAZ
- MEDANOS
- COLON
- ALDEA VALLE MARIA
- NOGOYA
- URDINARRAIN
- BOVRIL

1.- Zonas sin casos, con casos importados o esporádicos

- Resto de las localidades


***CLASIFICACIÓN DE LOCALIDADES SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA**

Cada situación requiere la toma de decisiones por parte de las jurisdicciones de las medidas a implementar, teniendo en cuenta no sólo la situación epidemiológica, sino las particularidades que presenta cada localidad.

Según la situación epidemiológica, las localidades se clasifican en:

1-Zonas sin casos o con casos importados

Casos provenientes de otros países u otras provincias



2-Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados

- 2 o más casos confirmados de COVID-19 de transmisión local.
- En un lugar y en un período de tiempo determinado.
- Se puede establecer un nexo epidemiológico entre grupo de casos (conglomerado) ellos.
- Brotes controlados.



3-Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados¹ y casos confirmados de posible transmisión comunitaria

- 1 o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos siete días, que no presenten nexo epidemiológico definido.
- casos aislados de posible transmisión comunitaria
- Mas de dos conglomerados de casos no relacionados (según investigación epidemiológica, evaluar posible transmisión comunitaria (fase4).



4- Zonas con transmisión comunitaria sostenida

Conglomerados no relacionados, en los que se evidencia al menos tres cadenas de transmisión sucesivas², y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos.

