

## **ACTUALIZACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (al 13-10-2020)**

El siguiente documento COES, hace referencia a la Clasificación de Zonas según Situación Epidemiológica, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación

<https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/clasificacion>

Esta clasificación es dinámica y será actualizada semanalmente, a partir de la información recabada en el SNVS 2.0 - SISA, con respecto a la presencia en cada localidad de casos confirmados activos y sus características epidemiológicas, en los últimos 14 días.\*

### **4.- Zonas con transmisión comunitaria sostenida**

- PARANÁ
- GUALEGUAYCHÚ

### **3.- Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria:**

- CHAJARI
- GUALEGUAY
- CRESPO
- LARROQUE
- CONCORDIA
- CONCEPCION DEL URUGUAY
- GENERAL RAMIREZ
- BASAVILBASO
- DIAMANTE
- VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN

### **2.- Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados:**

- ROSARIO DEL TALA
- SAN BENITO

- VIALE
- VICTORIA
- MARIA GRANDE
- COLONIA AVELLANEDA
- GOBERNADOR MANSILLA
- SANTA ELENA
- ALDEA MARIA LUISA
- NOGOYA
- MACIA
- VILLAGUAY
- ORO VERDE
- SAN SALVADOR
- MEDANOS
- URDINARRAIN

#### 1.- Zonas sin casos, con casos importados o esporádicos

- Resto de las localidades

#### **\*CLASIFICACIÓN DE LOCALIDADES SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA**

Cada situación requiere la toma de decisiones por parte de las jurisdicciones de las medidas a implementar, teniendo en cuenta no sólo la situación epidemiológica, sino las particularidades que presenta cada localidad.

Según la situación epidemiológica, las localidades se clasifican en:

##### **1-Zonas sin casos o con casos importados**

Casos provenientes de otros países u otras provincias



##### **2-Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados**

- 2 o más casos confirmados de COVID-19 de transmisión local.
- En un lugar y en un período de tiempo determinado.
- Se puede establecer un nexo epidemiológico entre grupo de casos (conglomerado) ellos.
- Brotes controlados.



**3-Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados<sup>1</sup> y casos confirmados de posible transmisión comunitaria**

- 1 o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos siete días, que no presenten nexo epidemiológico definido.
- casos aislados de posible transmisión comunitaria
- Mas de dos conglomerados de casos no relacionados (según investigación epidemiológica, evaluar posible transmisión comunitaria (fase4).



**4- Zonas con transmisión comunitaria sostenida**

Conglomerados no relacionados, en los que se evidencia al menos tres cadenas de transmisión sucesivas<sup>2</sup>, y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos.

